

Procedura przygotowania pacjenta do TK jamy brzusznej/miednicy

W dniu poprzedzającym badanie pielęgniarka informuje pacjenta o przygotowaniu do badania i przebiegu badania.

Pacjent pozostaje na czczo (co najmniej 6h wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych). Pacjent nie powinien ograniczać picia płynów nie gazowanych.

W dniu badania :

- pielęgniarka otrzymuje z pracowni tomograficznej przygotowany płyn ze środkiem cieniującym, który podaje pacjentowi do picia.
- zakłada wkłucie obwodowe **obowiązkowo w zgięcie łokciowe wenflon biały lub zielony.**

Po godzinie od wypicia kontrastu pacjenta należy przetransportować do pracowni TK z niezbędną dokumentacją (zgoda i skierowaniem na badanie).

Jeżeli wywiad z pacjentem nie jest możliwy, pielęgniarka bądź lekarz zaznacza z jakiego powodu.

Pacjent w czasie badania nie powinien posiadać na sobie metalowych przedmiotów.

Po badaniu pacjent powinien w miarę możliwości wypić do 2,5l płynów, aby usunąć kontrast z krwi, jeśli nie jest w stanie pić należy przetoczyć płyn dożylnie wg zlecenia lekarskiego.

